

Veelgestelde vragen

**DE KUNSTMATIGE URINAIRE
SFINCTER VOOR DE
BEHANDELING VAN STRESS-
URINE-INCONTINENTIE BIJ
MANNEN**



Veelgestelde vragen over uw ingreep

Hoe lang duurt de ingreep voor de kunstmatige urinaire sfincter?

De ingreep is minimaal invasief en duurt meestal ongeveer anderhalf uur. De ingreep wordt doorgaans poliklinisch uitgevoerd. Dat betekent dat patiënten dezelfde dag of vroeg de volgende ochtend naar huis gaan.

Zal iemand kunnen zien dat ik een implantaat heb?

Zodra het implantaat op zijn plaats zit, is het niet zichtbaar. Het zit volledig verborgen in het lichaam. Niemand zal het weten, tenzij u het zelf vertelt - zelfs niet in de kleedkamer.

Hoe lang duurt het herstel?

Uw uroloog begeleidt uw nazorg na de ingreep en in de weken daarna. Tijdens de controleafspraak na vier tot zes weken zal uw uroloog de kunstmatige urinaire sfincter activeren en u leren hoe u het hulpmiddel gebruikt.

Veelvoorkomende vragen om aan uw arts te stellen

Wat moet ik vóór mijn ingreep doen?

Wat zijn de risico's van de operatie?

Hoe tevreden zijn patiënten met de resultaten van deze ingreep?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Mag ik na de ingreep zelf naar huis rijden?

Wat moet ik doen om een goede genezing te bevorderen?



Aanvullende informatie

Leven met een hulpmiddel

Als u vragen heeft over hoe het is om met een implantaat te leven, of als u aanvullende informatie wilt van een andere patiënt die deze operatie heeft ondergaan, neem dan contact op met een lokale patiëntcontactpersoon. Uw arts kan u mogelijk de naam en contactgegevens geven van een lokale patiëntcontactpersoon die uw vragen kan beantwoorden.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Aan alle medische ingrepen zijn risico's verbonden, zowel aan de ingreep zelf als aan het gebruik van het hulpmiddel. Uw arts is de beste bron van informatie over de risico's en voordelen van de kunstmatige urinaire sfincter. Bespreek met uw arts de volledige lijst met risico's, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie. De kunstmatige urinaire sfincter is bedoeld voor gebruik bij de behandeling van stress-urine-incontinentie bij mannen (intrinsieke sfincterinsufficiëntie) na prostaatchirurgie.

Mannen met diabetes, ruggenmergletsel of huidinfecties kunnen een verhoogd risico op infectie hebben. Sommige hulpmiddelen bevatten een antibioticum in de vorm van een antibiotische oppervlaktebehandeling. Het hulpmiddel is mogelijk niet geschikt voor patiënten die allergisch zijn voor de antibiotica in het hulpmiddel (rifampicine, minocycline of andere tetracyclines) of systemische lupus hebben. Mogelijke risico's zijn onder meer: storing of defect van het hulpmiddel waardoor een extra operatie nodig is, slijtage of verlies van weefsel (erosie van hulpmiddel/weefsel), niet kunnen urineren (urineretentie), infectie en pijn of gevoeligheid.

LET OP: Volgens de wet mogen deze hulpmiddelen uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en gebruiksinstructies zijn te vinden in de productetikettering die bij elk hulpmiddel wordt geleverd of op www.IFU-BSCI.com. De getoonde producten zijn uitsluitend bedoeld voor INFORMATIEVE doeleinden en zijn mogelijk niet goedgekeurd of beschikbaar voor verkoop in bepaalde landen. Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet voor medische diagnose. Deze informatie vormt geen medisch of juridisch advies en Boston Scientific doet geen uitspraken over de medische voordelen die in deze informatie worden genoemd. Boston Scientific raadt u ten eerste aan om uw arts te raadplegen over alle zaken met betrekking tot uw gezondheid.

Alle afbeeldingen zijn eigendom van Boston Scientific. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

MH-1090502-AA.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2026 Boston Scientific Corporation
of haar gelieerde ondernemingen.
Alle rechten voorbehouden.