

Preguntas frecuentes



**IMPLANTES DE PENE
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL**

Preguntas frecuentes Sobre su intervención

¿Se trata de una intervención que requiere hospitalización?

Normalmente, sí; sin embargo, se trata de una decisión que tomarán usted y su urólogo conjuntamente.

¿Cuánto tiempo dura una intervención de implante de pene?

El implante de una prótesis de pene requiere una intervención quirúrgica que generalmente dura entre 30 minutos y 2 horas.

¿Se podrá saber visualmente que llevo un implante?

Una vez colocado, el implante será totalmente indetectable. Quedará totalmente oculto en su cuerpo. Nadie lo sabrá, si usted no lo dice, incluso en un vestuario.

¿Cuánto dolor experimentaré?

Es posible que experimente dolor o molestias en la(s) zona(s) de la operación en los momentos inmediatamente posteriores a la intervención y la primera vez que utilice la prótesis. En la mayoría de los casos, el dolor desaparece pocas semanas después de la intervención; sin embargo, se conocen algunos casos de dolor crónico (continuo).¹

¿Cuánto tiempo tendré que esperar después de la cirugía para poder usar el implante?

El médico le explicará cuándo podrá utilizar el dispositivo. Con una prótesis de pene, la mayoría de los médicos le recomendarán esperar de cuatro a seis semanas para tener relaciones sexuales.¹

¿Es doloroso el proceso de inflado?

Para inflar el implante, tiene que apretar la bomba que lleva en el escroto para enviar líquido a los cilindros del pene. Esto requiere cierta destreza manual, pero no tiene por qué ser doloroso. Si siente dolor, póngase en contacto con su médico.¹

¿Son compatibles con la RM los implantes de pene de Boston Scientific?

Los implantes de Boston Scientific son condicionalmente compatibles con la RM, lo que significa que un paciente con uno de estos dispositivos podrá someterse a dichas exploraciones en determinadas condiciones, pero no siempre. Consulte a su urólogo.

Preguntas habituales para el médico

¿Qué tengo que hacer antes de la intervención?

¿Cuáles son los riesgos de esta operación?

¿En qué medida quedan satisfechos los pacientes con los resultados de esta intervención?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

¿Podré volver a casa conduciendo yo mismo después de la intervención?

¿Qué tendré que hacer para garantizar una correcta cicatrización?

Recursos adicionales

Vivir con un implante

Si desea obtener más información o si tiene preguntas relacionadas con lo que significa vivir llevando un implante, visite

www.urologymatters.com.



Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su urólogo especialista en cualquier momento, ya sea antes o después de la intervención.

1. AMS 700™ with MS Pump Series Inflatable Penile Prosthesis Patient Manual. American Medical Systems, Inc. 2019.

Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

PRECAUCIÓN: Las leyes solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Estos productos se muestran únicamente con fines INFORMATIVOS y es posible que no estén aprobados o no se puedan vender en determinados países. Material no concebido para su uso en Francia.

Producto solo disponible en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Compruebe la disponibilidad con su representante de ventas local o con el servicio de atención al cliente.

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

MH-1086002-AA.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2025 de Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados.